

Aptomectin Plus

INYECTABLE SOLUCIÓN

Ivermectina 3,15 %
Ectoendoparasiticida
Inyectable de larga acción para Bovinos

EXPORTACIÓN EXCLUSIVA



FÓRMULA:

Ivermectina: 3,15g. ; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de ecto y endoparasitosis en bovinos, para combatir nematodos gastrointestinales, (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia) pulmonares, miasis cutáneas, ura, piojos y ácaros.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía subcutánea exclusivamente a razón de 1 ml. cada 50 kg. de peso vivo. (630 mcg de ivermectina por kg. de peso vivo.) Aplicar por delante o detrás de la paleta.

PRESENTACIÓN:

Frascos Ampolla conteniendo 50 y 500 ml.

Aptomectin

INYECTABLE SOLUCIÓN

Ivermectina 1%
Ectoendoparasiticida de Amplio Espectro
Para Bovinos



EXPORTACIÓN EXCLUSIVA

FÓRMULA:

Ivermectina: 1g. ;Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de ecto y endoparasitosis en bovinos, para combatir nematodos gastrointestinales, (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia) pulmonares, miasis cutáneas, ura, piojos y ácaros.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía subcutánea exclusivamente a razón de 1 ml. cada 50 kg. de peso vivo. (200 mcg de ivermectina por kg. de peso vivo.) Aplicar por delante o detrás de la paleta.

PRESENTACIÓN:

Frascos Ampolla conteniendo 50 y 500 ml.

Aptomectin

COMPRIMIDOS

Ectoendoparasiticida de Amplio Espectro para caninos



EXPORTACIÓN EXCLUSIVA

FÓRMULA:

- a) Ivermectina 0,6 mg.; Praziquantel: 10 mg; Pamoato de pirantel :40 mg. excipientes: c.s.p. 1 comprimido.
b) Ivermectina 1,5 mg.; Praziquantel: 25 mg; Pamoato de pirantel :100 mg. excipientes: c.s.p. 1 comprimido.
c) Ivermectina 4,5 mg.; Praziquantel: 75 mg; Pamoato de pirantel: 300 mg. excipientes: c.s.p. 1 comprimido.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de ecto y endoparasitosis: piojos pulgas, garrapatas Sarna sarcóptica, notoédrica, otodéctica y demodectica Ancylostomiasis, Trichuriasis, Uncinariasis, Ascaridosis, Teniasis y otras enfermedades producidas por Cestodes.

DOSIFICACIÓN:

Vía Oral

- Perros y gatos de 2 kg.: 1 comprimido de 100 mg
Perros y gatos de 5 kg.: 1 comprimido de 250 mg.
Perros de 15 Kg.: 1 comprimido de 750 mg.

En animales de mayor peso aumentar la dosis a razón de 1 comprimido de 250 mg. cada 5 kg. de peso vivo.

PRESENTACIÓN:

- Envase de 2 comprimidos de 100 mg.
Envase de 2 comprimidos de 250 mg.
Envase de 2 comprimidos de 750 mg.

Aptomectin Fasciolicida

SUSPENSIÓN ORAL



Antiparasitario interno para Ovinos

FÓRMULA:

Ivermectina: 0,2 gr.; Triclabendazole: 12 gr.; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de endoparasitosis en ovinos, para combatir nematodos pulmonares, gastrointestinales, (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia)
Para el tratamiento de la fasciolosis hepática (Saguaype)

SUMINISTRO Y DOSIS:

1 ml. Cada 10 kg. de peso vivo (200 mcg de Ivermectina por Kg. de peso vivo y 12 mg. de Triclabendazole por Kg. de peso vivo).

En caso de infestaciones graves puede repetirse la dosis con un intervalo no menor a 120 días.

PRESENTACIÓN:

Bidón de 2500 y 5000 ml.

Apto

COMPRIMIDOS

Antiparasitario interno de amplio espectro para Caninos y Felinos



FÓRMULA:

Albendazole 300 mg., Prazicuantel 25 mg., excipientes c.s.p. 1 comprimido.

INDICACIONES:

Para combatir parasitosis internas producidas por Ancylostomas, Trichuris, Uncinarias, Toxocara, Dipylidium y Taenia ssp.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía oral, Cachorros y Adultos: 1 comprimido cada 10 Kg. de peso vivo preferentemente en ayunas. En trichuriasis severas repetir la medicación a las 24 horas.
En teniasis duplicar la dosis.

PRESENTACIÓN:

Envase de 40 y 160 Comprimidos.

Aptomax

COMPRIMIDOS

Antiparasitario interno de amplio espectro para Caninos

**FORMULA:**

Ricobendazole: 200 mg.; Praziquantel: 50 mg.; Excipientes: c.s.p 1 Comprimido.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de Ancylostomiasis y Uncinariosis canina, Trichuriasis canina, Ascaridosis canina y Tenasis canina.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Via oral. 1 comprimido cada 10 kpv.

PRESENTACION:

Envase de 2, 4 y 6 comprimidos.

Aptomax

SOLUCION

Antiparasitario interno de amplio espectro
para Cachorros
Caninos y Felinos

FORMULA:

Ricobendazole: 3 gr.; Excipientes c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de las parasitosis producidas por *Ancylostoma caninum*, *Toxacara canis*, *Toxacara cati* y *Toxocaris leonina*. *Uncinaria stenocephala* y *trichuris vulpis*.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Via oral. 1 ml. por kpv. En animales con infestaciones severas repetir a las 24 hs.

PRESENTACION:

Gotero de 15 ml.



AptoFen

INYECTABLE



Antiparasitario Interno de amplio espectro para Bovinos.

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares. Ovicida, larvicida y adulticida.

Nematodos gastrointestinales: Ostertagia Ostertagi, Trichostrongylus Axei, Trichostrongylus columbriformis Haemonchus Placei, Cooperia Oncophora Oesophagostomun Radiatum, Oesophagostomun Columbianum Nematodos pulmonares: Dictyocaulus Viviparus.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Inyectable por vía subcutánea, delante ó detrás de la paleta. Se deberán observar las normas de asepsia aplicables a productos inyectables.

ADVERTENCIA:

Puede producir alguna reacción de hipersensibilidad, si hiciera falta, aplicar tratamiento sintomático.

RESTRICCIONES DE USO:

No utilizar en animales sensibles a cualquiera de los componentes de la formulación.

DOSIFICACIÓN:

1 ml cada 50 kg de peso vivo (2,5 mg/kg p.v.)
No inyectar más de 10 ml por punto de aplicación.

PRESENTACIÓN:

Envase de 500 y 50 ml.

Apto Polvo

Antiparasitario externo
para Caninos y Felinos



FÓRMULA:

Carbarilo: 5 g., esencias aromatizantes: 1 g., excipientes: c.s.p. 100 g.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de las ectoparasitosis de los pequeños animales, combate piojos y pulgas.

SUMINISTRO Y DOSIS:

USO EXTERNO

Espolvorear en cantidad suficiente sobre el pelaje del animal frotando a contrapelo, procurando que el polvo tome contacto con la piel, repetir a los 8 días.

Las reinfestaciones se evitan espolvoreando las cuchas, mantas y camas.

PRESENTACIÓN:

Talquera x 150 g.

Fitp

PIPETA

Antiparasitario externo.
Pulguicida y Garrapaticida para Caninos



FÓRMULA:

Imidacloprid: 6 gr.; Permetrina: 24 gr.; excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Antiparasitario externo
Pulguicida, piojicida, garrapaticida, repelente de moscas y mosquitos para Caninos

DOSIFICACIÓN:

Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, de acuerdo a su peso, en la nuca o entre los omóplatos, para evitar el lamido, procurando que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal.

Perros hasta 4 Kg. de peso:	Pipeta de 0,52 ml.
Perros de 4 a 10 Kg. de peso:	Pipeta de 1,3 ml.
Perros de 10 a 25 Kg. de peso:	Pipeta de 3,25 ml.
Perros de 25 a 40 Kg. de peso:	Pipeta de 4,6 ml.

PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo 1 pipeta

Fit f

PIPETA



Antiparasitario externo.
Pulguicida y Garrapaticida para Caninos.

FÓRMULA:

Imidacloprid: 10 g.; Flumetrina: 1 gr.; Metopreno: 10 g.; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Antiparasitario externo
Pulguicida, garrapaticida, repelente de moscas y mosquitos para Caninos

DOSIFICACIÓN:

Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, de acuerdo a su peso, en la nuca o entre los omóplatos, para evitar el lamido, procurando que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal.

Perros hasta 4 Kg. de peso:	Pipeta de 0,4 ml.
Perros de 4 a 10 Kg. de peso:	Pipeta de 1ml.
Perros de 10 a 25 Kg. de peso:	Pipeta de 2,5 ml.
Perros de 25 a 40 Kg. de peso:	Pipeta de 4 ml.
Perros de 40 a 60 Kg. de peso:	Pipeta de 6 ml.

PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo 1 pipeta

Fit g

PIPETA



Antiparasitario externo.
Pulguicida para Felinos

FÓRMULA:

Imidacloprid: 10 gr.; excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Antiparasitario externo para felinos

DOSIFICACIÓN:

Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal en la nuca o entre los omoplatos, para evitar el lamido, procurando que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo 1 pipeta

Fit

SOLUCIÓN EMULSIONABLE



Antiparasitario Externo
Piretroide y Organofosforado
Pulgucida-Garrapaticida para caninos y ambiente

INDICACIONES:

Antiparasitario externo. Pulgucida, piojicida y garrapaticida para perros.

DOSIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO:

Caninos: Uso externo. Diluir 15 ml del producto por litro de agua. Una vez diluido el producto, utilizar esta emulsión para enjuagar al animal después del baño. Se aconseja repetir el tratamiento a los 10-12 días.
Ambiente: Diluir 15 ml del producto en 2 litros de agua.
Una vez diluido el producto, utilizar la emulsión para baldear o rociar el lugar deseado.

CONSERVACIÓN:

Entre 4° y 25° C protegiéndolo de la luz solar directa.

CONTRAINDICACIONES:

La hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto es una contraindicación para su empleo

USO EXTERNO

Repetir, si fuera necesario entre los 10 a 12 días de aplicado.

RESTRICCIONES DE USO:

No usar en cachorros menores de 8 semanas. No utilizar en hembras preñadas. Evitar el uso en animales enfermos o debilitados. **No usar en gatos.**

Amox Plus

COMPRIMIDOS



Antibiótico de amplio espectro
para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

Amoxicilina: 250 mg ; Clavulanato de potasio 62,5 mg. ; CSP 1 comprimido.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos sensibles a su espectro.
Infecciones gastrointestinales, respiratorias, genitourinarias, otitis, infecciones cavitarias, de piel y tejidos blandos.

Suministro y Dosis

Suministro y dosis: vía oral 1 comp. cada 20kpv cada 8 a 12 horas

Presentación

Envase de 50 comprimidos.

Cefal 500

COMPRIMIDOS



Cefalexina. Antibiótico de Amplio Espectro para Caninos y Felinos

FORMULA:

Cefalexina: 500 mg.; Excipientes: c.s.p. 1 comprimido.

INDICACIONES:

Para combatir enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Grampositivos y Gramnegativos, sensibles a la cefalexina. Específico para el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, osteoarticulares, gastrointestinales, oído medio, vías respiratorias o genitourinarias.

SUMINISTRO DE DOSIS:

Vía oral. 25-30 mg. por Kg. de peso vivo, cada 8-12 hs. Por un periodo no menor a 7 días. En infecciones rebeldes (piel) puede suministrarse por un lapso mayor a 30 días.

PRESENTACIÓN:

Envase de 80 comprimidos.

Floxacin Aviar

SOLUCIÓN ORAL



Enrofloxacin al 10%
Quimioterápico de amplio espectro para Aves

FÓRMULA:

Enrofloxacin: 10 g.; Excipientes: c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Grampositivos y Gramnegativos sensibles a su espectro. Específico para el tratamiento de infecciones severas de las aves (pollos, reproductores y pavos), colibacilosis, coriza infecciosa, salmonellosis, enfermedad respiratoria crónica (ERC) y otras secundarias a procesos virales.

SUMINISTRO Y DOSIS:

En el agua, como única fuente de bebida, al 0,5 por mil (500 ml. en 1.000 litros de agua). Efectuar la dilución diariamente y suministrar sin intervalos durante 3 a 7 días.

PRESENTACIÓN:

Envase x 1000 ml.

BENEFICIOS:

Quimioterápico de Amplio Espectro
Para dilución en agua de bebida
Para Aves

Floxacin 50mg.

COMPRIMIDOS



Quimioterápico de amplio espectro para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

Enrofloxacin: 50 mg.; Excipientes: csp 1 comp.

INDICACIONES:

Quimioterápico de amplio espectro y larga acción.

Por su efectividad antimicrobiana sobre Piodermitis (Pseudomona Aeruginosa), Neumonías (Pseudomonas, Klebsiella, Serratía), Enteritis (E. Coli, Salmonellas), Nefritis (proteus, Stafilococcus, E. Coli) y Otitis (Pseudomonas, etc.) resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía oral, 1 comprimido (50mg.) cada 10 kgs. de peso vivo cada 24 horas durante 10 días.

PRESENTACIÓN:

Envase de 100 comprimidos

Floxacin 100mg.

COMPRIMIDOS



Quimioterápico de amplio espectro para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

Enrofloxacin: 100 mg.; Excipientes: csp 1 comp.

INDICACIONES:

Quimioterápico de amplio espectro y larga acción.

Por su efectividad antimicrobiana sobre Piodermitis (*Pseudomona Aeruginosa*), Neumonías (*Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Serratía*), Enteritis (*E. Coli*, *Salmonellas*), Nefritis (*proteus*, *Stafilococcus*, *E. Coli*) y Otitis (*Pseudomonas*, etc.) resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía oral, 1 comprimido (100mg.) cada 20 kgs. de peso vivo cada 24 horas durante 10 días.

PRESENTACIÓN:

Envase de 100 comprimidos

Floxacin

SOLUCIÓN INYECTABLE

ENROFLOXACINA

Quimioterápico de amplio espectro para Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos

FORMULA:

Enrofloxacin 5 g.; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes de Gram positivos y Gram negativos. Especifico para el tratamiento de infecciones severas, crónicas o rebeldes a otras medicaciones antibióticas, como piodermitis, infecciones recurrentes del aparato urogenital, otitis infecciosa e infecciones secundarias a procesos virales.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía subcutánea o intramuscular: 1 ml. (50 mg.) cada 10 kgs. de peso, cada 24 hs. durante 10 días.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 3 frascos ampolla de 25 ml. c/u; Frasco de 500 ml.



Floxacin

ÓTICO



Quimioterápico de amplio espectro
Anestésico local para Caninos y Felinos

FORMULA:

Enrofloxacin 2,5 g., Lidocaína clorhidrato 2 g., Clotrimazole 1 g., Excipientes c.s.p.100 ml.

INDICACIONES:

Por su efectividad antimicrobiana sobre las Otitis, resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Uso externo. Limpiar prolijamente el conducto auditivo externo, librándolo de exudados, pus y restos celulares. Luego aplicar profundamente con la jeringa 0,5 ml. Estirar la oreja levemente hacia arriba para facilitar la penetración del producto. Repetir una vez por día hasta la remisión de los síntomas.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 3 jeringas dosificadoras de 10 ml.

RifasolTop

SPRAY

Solución acuosa para uso tópico
Antibiótico bactericida para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

Rifamicina sódica: 1g; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos sensibles a su espectro. Aplicar sobre heridas, úlceras, forúnculos, quemaduras; piodermitis superficiales y profundas concomitante con la terapia parenteral, Dermatitis por lamido.

DOSIFICACIÓN:

Caninos y felinos: 3 a 4 aplicaciones diarias (la dosis puede incrementarse si es necesario). Se emplea localmente para lavados o para instilarla en cavidades, previa aspiración del contenido purulento y eventual lavado con solución fisiológica; puede además utilizarse para embeber gasas y para infiltraciones en zonas infectadas.

Uso externo: aplicaciones sobre heridas, úlceras, furúnculos, quemaduras, etc. Rociar la zona afectada, 3 o 4 veces por día, colocar vendas o apósitos para evitar el lamido.

PRESENTACIÓN:

Frasco con válvula dosificadora, conteniendo 30 ml.



Tribiotic-LA

INYECTABLE



Suspensión acuosa estéril

Antibiótico de amplio espectro para equinos, bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos.

FÓRMULA:

Benzilpenicilina procaína: 10.000.000.Ul.; Benzilpenicilina benzatina: 10.000.000.Ul.; Dihidroestreptomicina: 20g. Agentes de formulación: c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos sensibles a la penicilina y a la estreptomicina.

Equinos: Septicemias, tétanos, infecciones urinarias, uterinas y pulmonares.

Bovinos: Carbunco sintomático, actinomicosis, blefaritis purulentas, necrobacilosis, nefritis, difteria, y absesos hepáticos, edema maligno, metritis infecciosa.

Ovinos: Edema maligno (clostridium), infecciones pulmonares, renales y uterinas.

Caprinos: Ectima contagioso, leptospirosis, Infecciones de las vías respiratorias.

Porcinos: Mastitis, poliartritis, mal rojo, bronquitis, neumonías e infecciones urinarias y uterinas.

Caninos y felinos: Septicemia del recién nacido, bronquitis, cistitis, infecciones pulmonares renales, endocarditis, osteomielitis, amigdalitis, vaginitis, peritonitis.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía intramuscular o subcutánea, como dosis general:

Animales grandes: Bovinos y Equinos: 10 ml. cada 100 kg. de peso vivo.

Terneros, potrillos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos grandes: 1-2 ml. cada 25 kg. de peso vivo.

Porcinos grandes: 5 ml. cada 50 kg. de peso vivo.

Caninos: 1 ml. por animal.

Felinos: 0,5 ml. por animal

Habitualmente, basta con sólo 1 aplicación, si fuera necesario, repetir a las 72 horas. En gatos se recomienda la vía subcutánea.

PRESENTACIÓN:

Frasco Ampolla de 25 y 100 ml.

Dexa 400

INYECTABLE

Antiinflamatorio Glucocorticoide de alta concentración y efecto ultra rápido
Para equinos, bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos.

Solución acuosa Inyectable



FÓRMULA:

Dexametasona 21 fosfato disódico: 0,4 g. Excipientes c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Antiinflamatorio esteroide, gluconeogénico y antialérgico de rápida acción..

Está indicado para afecciones cutáneas como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen alérgico.

Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo y otras enfermedades que requieran tratamiento con glucocorticoides.

Está recomendado en la terapéutica de anafilaxia, broncoespasmo, traumatismos cráneo encefálicos, síndrome de compresión medular, raquialgias, neuralgias y neuropatías, artropatías, mialgias y miopatías, tendinitis, bursitis, enfermedades autoinmunes, stress, síndrome anoréxico y azoturia del animal de deporte.

Se podrá utilizar en alergias dermatológicas o respiratorias, asma bronquial, cetosis y como agente inductor del parto.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Dosis de referencia:

Caninos y felinos: Como antiinflamatorio. de 0.025 a 0,2 mg / kpv (0,25 a 2 mg / 10 Kg.) (0,0625 a 0,5 ml / 10 Kg.)

En shock: 5 mg / kpv. Vía EV.

Ovinos, caprinos, porcinos: Como antiinflamatorio de 0,06 a 0,08 mg / kpv. (de 0,6 a 0.8 mg / 10 kpv) (de 0,15 a 0,20 ml / 10 kg.)

En shock: 3 mg. Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs.

Bovinos y equinos: Como antiinflamatorio de 0,06 a 0,08 mg./kpv. (de 6 a 8 mg / 100 kpv.) (de 1,5 a 2 ml.).

En shock: 3 a 6 mg./kpv. Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs.

Se recomienda, aplicar de 1 a 3 veces por día, de acuerdo a las distintas patologías y / o según mejor criterio profesional.

PRESENTACIÓN:

Frasco ampolla conteniendo 25 ml.

Dexa 2000

SHOCK INYECTABLE

Solución acuosa Inyectable

Antiinflamatorio Glucocorticoide de alta concentración y efecto ultra rápido para equinos, bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos.



FÓRMULA:

Dexametasona 21 fosfato disódico: 2 g. Excipientes c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Está indicado en la terapéutica de emergencia de diversos estados de **shock**, anafilaxia, bronco espasmo, traumatismos cráneo-encefálicos, síndrome de compresión medular, raquialgias, neuralgias y neuropatías, artropatías, mialgias y miopatías, tendinitis, bursitis, enfermedades autoinmunes, stress, síndrome anoréxico y azoturia del animal de deporte. Se podrá utilizar en alergias dermatológicas o respiratorias, asma bronquial, cetosis y como agente inductor del parto.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Dosis de referencia:

Caninos y felinos: En shock: 5 mg/kg. (0,25 ml / kpv.). Vía endovenosa. Repetir a las 3 o 6 hs.

Ovinos, caprinos y porcinos: En shock 3 mg. / kpv. (0,15 ml / kpv.) Vía endovenosa. Repetir a las 3 o 6 hs.

Bovinos y Equinos: En shock: 3 a 6 mg. / kpv. (0,15 a 0,30 ml / kpv.) Vía endovenosa. Repetir a las 3 o 6 hs.

PRESENTACIÓN:

Frasco ampolla conteniendo 25 ml.

Doloprofen

COMPRIMIDOS



CARPROFENO

Antiinflamatorio no esteroide de uso oral
Para Caninos

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:
Carprofeno 100 mg
Excipientes csp 1 comprimido.

INDICACIONES:

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético indicado par el tratamiento del dolor y la inflamación asociada a la osteoartritis canina exclusivamente.

Administración y dosis: la dosis recomendada es de 2.2 mg/kg cada 12 horas o 4.4 mg/kg cada 24 hs.

La duración del tratamiento queda a criterio clínico y de acuerdo a la evolución del cuadro.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en casos de hipersensibilidad comprobada al principio activo.

No utilizar en felinos

No administra asociado a otros antiinflamatorios,

PRECAUCIONES:

Pueden aparecer episodios de desordenes gastrointestinales y renales. Interrumpir el tratamiento en caso de anorexia, vómitos, diarrea, melena, polidipsia, anemia, ictericia, letargia e incoordinación.

Se debe tener precaución en casos de animales mayores que presenten enfermedades crónicas persistentes, insuficiencia renal o hepática y en casos de desordenes sanguíneos como enfermedad de Von Willebrand.

Tramalgín 50

SOLUCIÓN INYECTABLE



TRAMADOL

Analgésico antiinflamatorio no esteroide
Para Caninos

FÓRMULA:

Tramadol 5g.; Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Antiinflamatorio, analgésico indicado par el tratamiento del dolor y la inflamación asociada a la osteoartritis, post operatorio o traumatismos. Para caninos exclusivamente.

SUMINISTRO Y DOSIS:

La dosis recomendada es de 1 a 3 mg /kpv. (0,5 a 1,5 ml) 2 a 3 veces por día, máximo 10 mg. / kpv. (0,2 ml) por día.

1 a 3 veces en el día, durante 5 días o mejor criterio médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en casos de hipersensibilidad comprobada al principio activo. O al resto de los componentes de la formulación.

No utilizar en felinos

No administra asociado a otros antiinflamatorios,

PRECAUCIONES:

Pueden aparecer episodios de desordenes gastrointestinales y renales. Interrumpir el tratamiento en caso de anorexia, vómitos, diarrea, melena, polidipsia, anemia, ictericia, letargia e incoordinación.

Se debe tener precaución en casos de animales mayores que presenten enfermedades crónicas persistentes, insuficiencia renal o hepática y en casos de desordenes sanguíneos como enfermedad de Von Willebrand.

Dermil

COMPRIMIDOS

Antihistamínico-Antiinflamatorio para Caninos y Felinos



FÓRMULA:

Triamcinolona: 1,25 mg. Clorfeniramina maleato: 2,1 mg. Vitamina "A": 5000 U.I.,
Excipientes c.s.p. 1 comprimido.

INDICACIONES:

Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, prurito gral. o localizado, eczema húmedo o seco. Como antiinflamatorio y reconstituyente de la piel.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía oral 1 comprimido cada 20 Kg. de peso vivo

PRESENTACIÓN:

Envase de 100 y 400 Comp.

Dermil

CREMA



Antihistaminico-antiinflamatorio
Antibiótico-Antimicótico
Para caninos y felinos

FÓRMULA:

Betametasona 17 valerato: 0,10 g.;Gentamicina sulfato; 0,10 g.; Clotrimazole: 1 g. ;
excipientes: csp 100 g.

INDICACIONES:

Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, localizado, eczemas húmedos o secos, afecciones de origen alérgico y otras enfermedades de la piel que requieran tratamiento con corticoides. Como antiinflamatorio y reconstituyente de la piel.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Uso externo, aplicar localmente en cantidad suficiente en la zona afectada, de dos a tres veces por día. Cubrir para evitar el lamido.

CONTRAINDICACIONES:

No suministrar a hembras preñadas, ni a cachorros menores a 4 semanas.

Dermil

INYECTABLE

Antiinflamatorio – antialérgico
Glucocorticoide de depósito para Caninos y Felinos

Suspensión acuosa estéril



FÓRMULA:

Triamcinolona acetona: 0,6 g. Excipientes c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Afecciones cutánea como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen alérgico.

Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo y otras enfermedades que requieran tratamiento con glucocorticoides.

DOSIFICACIÓN:

Vía intramuscular, subcutánea, intraarticular, intrasinovial.

Caninos: Vía intramuscular o subcutánea: 0,1 a 0,2 mg / Kg. de peso vivo (0,33 ml cada 10 kg. de peso)

Felinos: Vía intramuscular o subcutánea 0,1 a 0,2 mg / kg. de peso vivo (0,15 ml por animal)

Infiltraciones: Caninos y felinos 1,2 a 1,8 mg. (0,2 a 0,3 ml.)

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 3 frascos ampolla de 10 ml. c/u

Novul

COMPRIMIDOS

Hormonal - Anticonceptivo
para Caninos y Felinos



Fórmula:

Clormadinona acetato 2 mg. excipientes c.s.p. 1 comprimido

Indicaciones:

Interrumpir del estro. Posponer el estro, metrorragias, ninfomanías, alteraciones del ciclo ovárico, pseudogestación e hipersexualidad en el macho. Prevención del estro en caninos y felinos hembras, en anestro.

Suministro y dosis:

Vía oral, interrumpir el estro: 1 comp. cada 5 kg. de peso durante 8-10 días.

Posponer el estro: 1 comprimido cada 10 kg. de peso durante 4 semanas.

Ninfomanía, pseudopreñez e hipersexualidad en el macho: 1 comprimido cada 5 kg. de peso según efectos.

Presentación:

Envase de 100 y 400 Comp.

Novul

INYECTABLE



Hormonal - Anticonceptivo para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

Medroxiprogesterona acetato 50 mg., excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES:

Prevención del estro en caninos y felinos hembras, en anestro.

DOSIFICACIÓN:

Caninos y felinos: 1 ml. (50 mg.) por animal, durante el anestro. Repetir cada 5/6 meses.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 12 ampollas de 1 ml. c/u.

Ket-Anes 50

INYECTABLE



Anestésico - Analgésico
para Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos

EXPORTACIÓN EXCLUSIVA

FORMULA:

Ketamina base (como clorhidrato): 5g. excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Anestésico disociativo, analgésico. Para inducir y mantener la anestesia.

SUMINISTRO Y DOSIS:

Vía intra venosa.

Caninos y felinos: 7 a 10 mg. p/kpv.

Equinos: 3 a 5 mg. p/kpv.

Bovinos: 5 mg. p/kpv.

Porcinos: 5 mg. p/kpv.

Ovinos: 3 mg. p/kpv.

Vía intramuscular.

Caninos y felinos: 15 a 20 mg. p/kpv.

Equinos: 15 mg. p/kpv.

Bovinos: 15 mg. p/kpv.

Porcinos: 15 a 20 mg. p/kpv.

Ovinos: 10 a 20 mg. p/kpv.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 2 frascos ampolla de 25 ml.

Prote-Cis articular

COMPRIMIDOS



Regenerador osteoarticular.
Condrogénico.
Antiartrosico para Caninos y Felinos

FÓRMULA:

D. Glucosamina: 400 mg.; Condroitin Sulfato: 100 mg.; Selenito de Sodio: 5 mg.; Vitamina C: 30 mg.; Vitamina E: 50 mg.; Manganeso Gluconato: 20 mg.; Excipientes c.s.p 800 mg.

INDICACIONES:

Condrocitogénico. Provee los elementos necesarios para la elaboración de proteoglicanos, indispensables para la rehidratación del cartilago, proceso básico para la recuperación de la elasticidad perdida y su capacidad amortiguadora.

SUMINISTRO Y DOSIS:

1 Comprimido por día durante el tratamiento.

PRESENTACIÓN:

Envase de 60 comprimidos.